

*Bucco noanamae*

**Nombre común:** bobo de Noanamá,  
chacurú barreado.




**Taxonomía**

Reino	Animalia
Filo	Chordata
Clase	Aves
Familia	Bucconidae
Especie	Bucco noanamae



- Descripción de la especie

Mide aproximadamente 18 cm de longitud. Las partes superiores son de color castaño oscuro tiznado; tiene garganta blanca, una banda de negro ampliamente desplegada sobre el pecho; el vientre es blanco manchado y barreteado de negro



- Hábitat

Vive en el bosque húmedo, bosque secundario y áreas adyacentes, por debajo de los 100 m de altitud, en la región del golfo de Urabá, el Atrato y el alto y medio San Juan. Anidan entuneles en barrancos o en termiteros.

- Alimentación

Se alimenta de insectos, pequeñas frutas e incluso pequeños vertebrados.



- Amenaza

Según la IUCN (NT). Además Está amenazado por destrucción de hábitat, debido a la expansión de las concesiones madereras, la ganadería y las plantaciones de banano y palma aceitera.

Andinobates victimatus

NOMBRE COMUN: Rana venenosa andina escarlata




### Taxonomía

Reino	Animalia
Filo	Chordata
Clase	Amphibia
Familia	dendrobatidae
Especie	Andinobates victimatus

## Descripción de la especie

Mide arroximadamente 20 milímetros de diametro, es un animal de color rojo brillante, las puntas de las extremidades son color gris claro y posee un veneno levemente letal, pues su toxicidad está más destinada a combatir a sus depredadores que a causar graves lesiones en los humanos.





- Hábitat

Habita en las selvas tropicales en el extremo noroeste de Colombia, en el golfo de Urabá

## Importancia

las ranas venenosas son de vital importancia para la herpetología, los habitantes de la zona y las culturas indígenas. Por ejemplo, estos anfibios dan a los nativos un insumo inestimable para impregnar de veneno sus dardos de caza



- Amenaza

Según la IUCN (no registra), pérdida de su hábitat para la expansión ganadera, quemadas para la caza o extracción de fauna silvestre y otras actividades producidas por el hombre

# Saguinus oedipus

Nombre común: tití piel roja o tití cabeza blanca



## Taxonomía

Reino	Animalia
Filo	Chordata
Clase	Mammalia
Familia	Callitrichidae
Especie	Saguinus oedipus



## Descripción de la especie

Tienen una cresta de pelos blanquecinos, desde la frente hasta la nuca, que caen hacia atrás. La espalda es parda y los brazos y piernas blancos o amarillentos, la cola es anaranjada en la base y negra en la punta. Pesan en promedio 500 g.



- Hábitat

Es un primate endémico de la costa atlántica colombiana, habitan al borde de los bosques o en las selvas secundarias al noroccidente de Colombia (Urabá, cuenca baja de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena).

### Alimentación

Comen frutas, néctar, hojas frescas o retoños e insectos.

- Amenaza

Según la IUCN (CR). Perdida de su hábitat por la intervención del hombre para fines productivos, trafico de fauna silvestre ilegal.





Gracias

Heyda Macea (2020)